



MEDICAMENTOS DE USO CORRIENTE EN LA PRÁCTICA DIARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS QUE NO SE HA DESCRITO AGRAVAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS

A02 APARATO DIGESTIVO

OMEPRAZOL
 PANTOPRAZOL
 LANSOPRAZOL
 DOMPERIDONA
 CLEBOPRIDE
 CINITAPRIDA
 METOCLOPRAMIDA
 DIMETICONA
 ONDANSETRON
 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO
 LACTULOSA
 LOPERAMIDA
 MESALAZINA

B02 HEMATOLOGIA

ACENOCUMAROL
 HEPARINAS INCLUIDAS BAJO PM
 ASPIRINA
 CLOPIDOGREL
 ÁCIDO TRANEXÁMICO
 FITOMENADIONA (Vitamina K)
 HIERRO

C01 TERAPIA CARDIOVASCULAR

DIGOXINA
 AMIODARONA
 NITROGLICERINA
 ISOSORBIDE
 DOXAZOSINA
 PRAZOSINA
 TIACIDAS
 INDAPAMIDA
 FUROSEMIDA
 TORASEMIDA
 ESPIRONOLACTONA
 PENTOXIFILINA
 BISOPROLOL*
 CARVEDILOL*
 AMLODIPINO*
 LISINOPRIL*
 RAMIPRIL*
 LOSARTAN
 OLMESARTAN
 BEZAFIBRATO
 GEMFIBROZOLO
 RESINCOLESTIRAMINA

H01 HORMONAS

CORTICOESTEROIDES
 LEVOTIROXINA

G01 UROLOGIA/GINECOLOGIA

KETOCONAZOL ORAL/TÓPICO
 METRONIDAZOL ORAL/TÓPICO
 PILDORAS ANTICOCEPTIVAS 3ª / 4ª GENERACION
 CIPROTERONA
 OXIBUTININA
 ALFUZOSINA
 DOXAZOSINA
 SERENOA REPENS
 SILDENAFILO

(*)= OCASIONALMENTE SE HA DESCRITO EMPEORAMIENTO DE LA MG CON EL USO DE FÁRMACOS DE LA MISMA FAMILIA TERAPÉUTICA. SE ACONSEJA MONITORIZAR EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO.



MEDICAMENTOS DE USO CORRIENTE EN LA PRÁCTICA DIARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS QUE NO SE HA DESCRITO AGRAVAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS

J01-ANTIINFECCIOSOS USO SISTEMICO

AMOXICLINA+CLAVULANICO*
 CEFTAZIDIMA*
 CEFIXIMA*
 TRIMETOPRIM
 TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL
 CLINDAMICINA*
 LINCOMICINA
 METRONIDAZOL
 MINOCICLINA*
 LINEZOLID
 KETOCONAZOL
 FLUCONAZOL
 RIFAMPICINA
 ACICLOVIR
 VACUNA DE LA GRIPE

M01 ANTIINFLAMATORIOS/ANTIREUMATICOS

DICLOFENACO
 PIROXICAM
 IBUPROFENO
 NAPROXENO
 CELECOXIB
 SALICILATOS
 TRAMADOL
 METAMIZOL
 ALOPURINOL

P01- ANTIHELMINTICOS

MEBENDAZOL
 PIPERAZINA

N02 NEUROLOGICOS

ERGOTAMINA+CAFEINA+PARACETAMOL
 SUMATRIPTAN
 ACIDO VALPROICO
 HALOPERIDOL
 RISPERIDONA
 SULPIRIDA
 AMITRIPTILINA
 CITALOPRAM
 ESCITALOPRAM
 FLUOXETINA
 BETAHISTINA
 FLUNARIZINA

(*)= OCASIONALMENTE SE HA DESCRITO EMPEORAMIENTO DE LA MG CON EL USO DE FÁRMACOS DE LA MISMA FAMILIA TERAPÉUTICA. SE ACONSEJA MONITORIZAR EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO.



**MEDICAMENTOS DE USO CORRIENTE EN LA PRÁCTICA DIARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
EN LOS QUE NO SE HA DESCRITO AGRAVAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS**

R01-SISTEMA RESPIRATORIO

NAFAZOLINA
CORTICOESTEROIDES
NEBULIZADOS
SALBUTAMOL
ALBUTEROL
TERBUTALINA
ACETILCISTEINA
AMBROXOL
CLEMASTINA
LORATADINA

**S01. PREPARADOS
OFTAMOLÓGICOS/ÓTICOS**

POMADA ÓTICO-
OFTÁLMICA/COLIRIO
HIDROCORTISONA
POMADA OFTÁLMICA/COLIRIO
FLUOROMETASONA
DICLOFENACO COLIRIO
CUIDADO CON ANTIBIÓTICOS (ver
sistémicos)
CUIDADO CON
ANTIGLAUCOMATOSOS TÓPICOS
CUIDADO CON BETA-
BLOQUEANTES TÓPICOS

(*)= OCASIONALMENTE SE HA DESCRITO EMPEORAMIENTO DE LA MG CON EL USO DE FÁRMACOS DE LA MISMA FAMILIA TERAPÉUTICA. SE ACONSEJA MONITORIZAR EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO.